

食道がん

レジメン名	薬剤名	基準投与量	基準投与日	1クール
術前化学療法 high dose FP	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² 800mg/m ²	day1 day1-5	21日
high dose FP	シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 700mg/m ²	day1 day1-4	28日
キイトルーダ+high dose FP	キイトルーダ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 80mg/m ² 800mg/m ²	day1 day1 day1-5	21日
キイトルーダ+5FU持続(維持療法)	キイトルーダ フルオロウラシル	200mg/body 800mg/m ²	day1 day1-5	21日
high dose CDGP/5FU	アクブラ フルオロウラシル	70mg/m ² 700mg/m ²	day1 day1-4	28日
high dose CDGP/5FU+DOC	ドセタキセル アクブラ フルオロウラシル	30mg/m ² 80mg/m ² 800mg/m ²	day1,15 day1 day1-5	28日
CDGP	アクブラ	80-100mg/m ²	day1	28日
CDGP/S1	アクブラ エスワンタイホウ配合OD錠T	80mg/m ² 80mg/m ² /日	day1 ※1	28日
low dose FP	シスプラチン フルオロウラシル	4mg/m ² 250mg/m ²	day1-5 day1-5	7日
weekly CDDP 3投1休	シスプラチン	30mg/m ²	day1,8,15	28日
DCF療法	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	75mg/m ² 75mg/m ² 750mg/m ²	day1 day1 day1-5	28日
FOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 1600mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日
ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	21日
weekly PAC3投1休	パクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15	28日
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14日
オブジーボ	オブジーボ	480mg/body	day1	28日
オブジーボ3週毎+ヤーボイ	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	day1,22 day1	42日
オブジーボ2週毎+ヤーボイ	オブジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	day1,15,29 day1	42日
術後補助療法 オブジーボ	オブジーボ	240mg/body × 8回投与、 以降480mg/body投与 (最長12ヶ月間まで)	day1	14日 28日
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21日
キイトルーダ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42日
エスワンタイホウ配合OD錠T	エスワンタイホウ配合OD錠T	80mg/m ² /日	※1	

※1:エスワンタイホウ配合OD錠Tの投与方法

患者の状態により投与スケジュールを①4週2休/6週 ②2週1休/3週 ③隔日投与 ④週4(月水金日) ⑤週4(火木土日)
⑥5投2休/7日 に適宜調整